

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

DLP 12-6-85523789

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

ABONNEMENT ANNUEL: 125 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94 Y

### BULLETIN "CULTURES MARAICHERES, LEGUMIERES ET POMMES DE TERRE" n° 114 -

7 JUIN 1985

#### POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

##### MILDIU

###### - Situation actuelle

- Développement du Mildiou dans les Côtes-du-Nord sur Duke et parfois Ostara, notamment à Plougrescant, Lanmodez, Pleubian, lorsque le traitement préconisé dans le bulletin du 24 mai n'a pas été effectué.

- Conditions climatiques très favorables au Mildiou et aux pourritures bactériennes.

###### - Toutes zones de primeur

Traitez toutes les parcelles qui seront récoltées après le 15 juin :

• Récolte prévue entre le 17 et le 24 juin, utilisez un produit à base de cuivre.

• Récolte prévue après le 24 juin, préférez une spécialité contenant une matière active systémique (Acylon, Pulsan) s'il y a

déjà quelques taches dans la parcelle. En l'absence de mildiou, produit de contact ou pénétrant.

##### DORYPHORE

Quelques doryphores ont été observés dans le Finistère et la région malouine. Ajoutez un insecticide : Birlane, Carbamult, Décis ... lorsque cet insecte est présent.

La lutte contre le doryphore est obligatoire.

##### PUCERONS

Des pucerons sont observés en grand nombre sur primeurs. Ces insectes étant vecteurs de virus, il est nécessaire de les combattre sur cultures destinées à la reproduction. Employez Pirimor G, Décis B ou Sumicidin.

#### POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

##### MILDIU

Nous rappelons qu'un traitement doit être réalisé dès le stade 20-25 cm, avec un fongicide de contact.

Actuellement, le temps orageux étant favorable à la maladie, renouveler la protection avec un produit de contact ou pénétrant si le premier traitement date de plus de 10 jours.

Se reporter au bulletin n° 111 du 15 mai qui donne des informations sur les divers produits utilisables.

##### DORYPHORE

Effectuer un traitement contre ce ravageur au stade jeune larve.

DERNIER NOTE : Bulletin n° 113 du 31 mai 1985

P18